

9300 186

Листовка: информация за пациента

Към Reg. №

Разрешение №

B6/БНБ/Б-5850/

Бронхикум 11,25 mg таблетки за смучене

Сух екстракт от машерка, стрък

Одобрение №

30-03-2022

Bronchicum 11.25 mg compressed lozenges**Thymi herba extractum siccum**

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Бронхикум таблетки за смучене и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Бронхикум таблетки за смучене
3. Как да приемате Бронхикум таблетки за смучене
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Бронхикум таблетки за смучене
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Бронхикум таблетки за смучене и за какво се използва

Бронхикум таблетки за смучене е лекарство от растителен произход.

Бронхикум таблетки за смучене е лекарство, което се използва за симптоматично лечение на кашлица. То улеснява втечняването на гъстия бронхиален секрет и неговото по-лесно отхрачване. Тази информация се основава на дългогодишен опит.

При треска, задух и ако оплакванията са неясни или продължават повече от 7 дни, моля консултирайте се с Вашия лекар.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Бронхикум таблетки за смучене

Не приемайте Бронхикум таблетки за смучене, ако сте свръхчувствителни (алергични) към машерка, друго растение от семейство Устоцветни (Lamiaceae) или някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Ако се появят задух, треска или гнойни храчки, се консултирайте с лекар.

Поради липса на достатъчно изследвания, Бронхикум таблетки за смучене не трябва да се

използва от бременни жени, по време на кърмене или от деца под 6 годишна възраст.

Този лекарствен продукт съдържа захароза. Пациенти с редки наследствени състояния като

фруктозна непоносимост, глюкозо-галактозна малабсорбция или сукрозо-изомалиаза, при недостатъчност не трябва да приемат това лекарство.



При пациенти със захарен диабет трябва да се вземе под внимание съдържанието на захароза в таблетките – 816 mg / таблетка

Указание за диабетици

1 таблетка отговаря на 0,07 ХЕ (хлебни единици).

Други лекарства и Бронхикум таблетки за смучене

Не са известни.

Моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт ако приемате, или насъкоро сте приемали други лекарства, дори и ако са такива, отпускані без рецепт.

Бременност, кърмене и fertилитет

Поради липса на достатъчно изследвания, Бронхикум Таблетки за смучене не трябва да се използва от бременни жени или по време на кърмене.

Шофиране и работа с машини

Бронхикум Таблетки за смучене не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Бронхикум таблетки за смучене съдържа захароза

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някой захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

3. Как да приемате Бронхикум таблетки за смучене

Винаги приемайте Бронхикум таблетки за смучене точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Оставете Бронхикум таблетки за смучене да се разтвори бавно в устата.

Ако не е предписано друго от лекар, е подходяща следната дозова схема:
Възрастни и деца над 12 години:

По 1-2 таблетки се смучат бавно до пет пъти дневно.

Деца над 6 годишна възраст:

По 1 таблетка се смуче 2-3 пъти дневно.

Доколкото е възможно, разпределете приема на таблетките на равни интервали през деня.
Продължителността на приемане не е ограничена, но моля, вземете под внимание
информацията дадена в раздел 1.

Ако сте приели повече от необходимата доза Бронхикум таблетки за смучене
Не са наблюдавани случаи на отравяне с Бронхикум таблетки за смучене.

Ако сте пропуснали да приемете Бронхикум таблетки за смучене

Ако сте пропуснали прием, продължете да вземате лекарството по обичайния начин. Никога не приемайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства и това лекарство е възможно да предизвика нежелани лекарствени реакции, въпреки че не всеки ги получава.

С неизвестна честота могат да се проявят реакции на свръхчувствителност, анафилактичен шок, кожни алергични реакции, обрив или копривен обрив (екзантема, уртикария), употреба на лицето, в устата и/или фарингеалното пространство (едем на Квинке), стомашни неразположения.



В такъв случай, моля, посъветвайте се с Вашия фармацевт, така че да се предприемат необходимите мерки. Моля, информирайте Вашия фармацевт, ако забележите някакви нежелани лекарствени реакции, които не са описани в тази листовка. В случай на нежелана лекарствена реакция, преустановете приемането на лекарството и се посъветвайте с Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, Тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Бронхикум таблетки за смучене

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура до 25°C.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлят лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

Забележка

Поради наличието на съставки от растителен произход видът на повърхността на таблетката може да се промени. Това не оказва влияние върху качеството или безопасността на продукта.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Активно вещество е: Thymi herba extractum siccum (сух екстракт от машерка, стрък).

Всяка таблетка съдържа Thymi herba extractum siccum (сух екстракт от машерка, стрък) 11,25 mg (2.5:5:1), еквивалентен на 100 mg течен екстракт от машерка (Thymi herba extractum fluidum) (1: 2-2,5)

Разтвор за извлечане: амонячен разтвор 10%: глицерол 85%: етанол 90 % (т./т.): вода (1:20:70:109)

Другите съставки са: захароза; повидон; левоментол; цинеол; колоиден безводен силициев диоксид; магнезиев стеарат; арабска гума; стеаринова киселина.

Как изглежда Бронхикум таблетки за смучене и какво съдържа опаковката

PVC/алуминиев блистер х 10 таблетки за смучене.

Оригинални опаковки с 20 или 50 таблетки за смучене.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Opella Healthcare France,
SAS 82 Avenue Raspail,
94250 Gentilly,
Франция

Производител



Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.
ul. Lubelska 52,
Rzeszów, 35-233
Полша

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:
СТАДА България ЕООД, тел.: + 02 9624626

Дата на последно преразглеждане на листовката:
Март 2022

