

за сива магаричка

<b>ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА</b>	
Листовка - Приложение 2	
Код на продукта №	9600001
Разрешение №	/
Одобрение №	2419 / 24.09.10

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА**

**Контрактубекс гел  
Contractubex® gel**

*Моля, прочетете внимателно преди употреба!  
 Запазете тази листовка, тъй като тя може да Ви е необходима отново.  
 Ако имате някакви допълнителни въпроси, се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.  
 Не преотстъпвайте това лекарство на други хора. То може да им навреди, дори, ако техните симптоми са същите като Вашите.  
 Ако някои от нежеланите реакции станат сериозни, или забележите нежелани лекарствени реакции, които не са описани в тази листовка, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт.*

В тази листовка:

1. Какво е Контрактубекс и за какво се използва
2. Преди да използвате Контрактубекс
3. Как да използвате Контрактубекс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Контрактубекс
6. Допълнителна информация

**1. Какво е Контрактубекс и за какво се използва**

Гел за прилагане върху кожата  
 100 g гел съдържат:  
 Течен екстракт от лук (Extr. Serape ) 10 g  
 Хепарин натрий (Heparinum sodium) 5000 IU  
 Алантоин (Allantoin) 1 g.

Контрактубекс представлява дерматологично средство за локална употреба при лечение на белези.

Контрактубекс се използва за лечение на груби, свръхразрастнали, зачервени, подути, ограничаващи движението и козметични белези след операции, ампутации, изгаряния и наранявания.

Контрактубекс притежава омекотяващ и изглаждащ ефект върху втвърдена, свръхразрастнала, болезнена и козметично увредена кожна тъкан. Хепарин улеснява хидрирането (водносвързващия капацитет) на втвърдената тъкан, като по този начин предизвиква набъбване и отпускане на белезите.


Екстрактум цепе и алантоин усилват този омекотяващ ефект.

Водноразтворимата гелова основа подпомага дълбокото проникване на активните съставки в кожата и така осигурява едно ефективно локално лечение.

**2. Преди да използвате Контрактубекс**

*Кога не трябва да използвате Контрактубекс?*

Контрактубекс не трябва да се използва при пациенти със свръхчувствителност към метил-парахидроксибензоат или други съставки на продукта.



*Какви предпазни мерки трябва да имате предвид при употреба?*

При лечение на пресни белези трябва да се избягват физическо дразнене като силен студ или облъчване с ултравиолетова светлина, както и интензивно втриване на гела.

Контрактубекс съдържа сорбинова киселина – има дразнещо действие и може да причини дерматит (възпаление на кожата).

*Кои други продукти оказват влияние върху ефекта на Контрактубекс или могат да бъдат повлияни при неговата употреба?*

Няма установени лекарствени взаимодействия.

*Какво трябва да имате предвид по време на бременност и кърмене?*

Няма данни за вредно въздействие на продукта по време на бременност и кърмене.

*Влияние върху способността за шофиране и работа с машини:*

Няма

### **3. Как да използвате Контрактубекс?**

*Дозировка и начин на употреба:*

Ако липсват конкретни указания от лекар, Контрактубекс се втрива с лек масаж върху кожата или белега до пълното проникване на гела, няколко пъти дневно (2-3 пъти). При случаи на стари и твърди белези, след намазване с гела се прави превръзка и се оставя да действа през нощта.

*Продължителност на употреба:*

В зависимост от големината на белега лечението се провежда няколко седмици или месеца (средно до 6 месеца, при стари и упорити белези до 1 година).

*Предозиране:*

Няма описани случаи на предозиране.

*Ако Ви е необходима допълнителна информация моля обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.*

### **4. Възможни нежелани реакции**

Контрактубекс се понася обикновено много добре, дори при по-продължително приложение. Дразнещо действие върху кожата, като възпаление на кожата, кожни обриви и сърбеж, може да се очаква в много редки случаи.

*При поява на нежелани реакции, които не са споменати в листовката, веднага информирайте Вашия лекар или фармацевт.*

### **5. Как да съхранявате**

Да се съхранява под 25°C!

Да се съхранява на места, недостъпни за деца!

### **6. Допълнителна информация**

**Срок на годност**

Срокът на годност е 4 години.

Срок на годност след първо отваряне: 6 месеца


Да не се използва след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката!

*Какво съдържа Контрактубекс*

100 g гел съдържа:

*Активни вещества:* Течен екстракт от лук (Extr. Cepae) 10 g, Хепарин натрий (Heparinum sodium) 5000 IU, Алантоин (Allantoin) 1 g.

*Другите съставки са:*



сорбинова киселина, метил-парахидроксibenзоат, ксантанова гума,  
полиетилен гликол 200, ароматизиращо масло, пречистена вода.  
*Как изглежда Контрактубекс. и какво е съдържанието на опаковката*  
Гел в туба от 20 g, 50 g, 100 g, поставена в картонена кутия.

**Производител и притежател на разрешението за употреба**

Merz Pharmaceuticals GmbH  
Eckenheimer Landstrasse 100-104  
60318 Frankfurt am Main

Германия

Медицинско представителство в България:

Либра ЕАД

**Дата на последна редакция на листовката**

Октомври 2010

