

Schaper & Brümmer GmbH & Co.KG

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Този лекарствен продукт се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на Фемикур Н.

- ◆ Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- ◆ Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- ◆ Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 90 дни.

В тази листовка:

1. Какво представлява Фемикур Н капсули и за какво се използва
2. Преди да приемете Фемикур Н капсули
3. Как да приемате Фемикур Н капсули
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Фемикур Н капсули
6. Допълнителна информация

Femicur® N capsules**Фемикур® Н капсули****Лекарствено вещество: сух екстракт от плодовете на vitex agnus castus**

- ◆ Лекарственото вещество е Vitex agnus castici, fructus, extractum siccum (сух екстракт от плодовете на vitex agnus castus):
1 твърда капсула съдържа:
4 mg Vitex agnus castici, fructus, extractum siccum (7-13:1)
Екстрагент: Ethanol 60% (m/m)

◆ Другите съставки са:

Глюкозен сироп (сух), лактоза монохидрат, талк, царевично нишесте, магнезиев стеарат, колоидален, безводен силициев диоксид, желатин, натриев лаурилсулфат, пречистена вода, оцветители железен оксид (E 172) и титанов диоксид (E 171).

Фемикур Н капсули се предлага в оригинална опаковка с по 60 твърди капсули и в оригинална опаковка с по 100 твърди капсули.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФЕМИКУР Н И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

- 1.1. Фемикур Н капсули е растителен лекарствен продукт за лечение на менструални нарушения, предменструален синдром, мастодиния



- 1.2.** Фемикур Н капсули се използва при нарушения в менструалния цикъл, предшестващи началото на менструацията (пременструален синдром), чувство за напрежение и подуване в гърдите (мастодиния).

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ ФЕМИКУР Н КАПСУЛИ

2.1. Не приемайте Фемикур Н капсули,

- ◆ ако сте свръхчувствителна към плодовете на vitex agnus castus или към някоя от останалите съставки на лекарствения продукт.
- ◆ ако имате хипофизома (тумор на хипофизата) или мастокарцином (рак на млечната жлеза).
- ◆ ако сте бременна или кърмите. Опити с животни са показали намаляване продукцията на майчино мляко при употребата на плодове от vitex agnus castus.

2.2. Шофиране и работа с машини

Не са необходими специални предпазни мерки.

2.3. Прием/употреба на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Има доказателства за взаимно отслабване на действието при едновременна употреба на Фемикур Н капсули с антагонисти на допаминовите рецептори.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ФЕМИКУР Н КАПСУЛИ

Винаги приемайте Фемикур Н капсули точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

3.1. Начин на употреба

За перорално приложение

3.2. Ако не е предписано друго обичайната доза е:

Приемайте 1 път дневно – сутрин, по 1 твърда капсула (съответстваща на 40 mg растителна дрога), несдъвкана, с малко течност (приблизително 1 чаша вода).

Курсът на лечението трябва да продължи няколко седмици (минимум три менструални цикъла) до облекчаване или изчезване на оплакванията.

3.3. Ако сте приели погрешно по-голямо количество Фемикур Н капсули, Вие трябва да говорите с Вашия лекар.

Не са наблюдавани симптоми на предозиране и интоксикация при перорално приложение на Фемикур Н капсули.

3.4. Ако сте забравили да приемете Фемикур Н капсули:

Не приемайте двойна доза, за да компенсирате забравената.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Фемикур Н капсули може да има нежелани реакции.



Нежеланите лекарствени реакции се подразделят по честота, както следва:

Много чести: повече от 1 на 10	Чести: по-малко от 1 на 10, но повече от 1 на 100
Нечести: по-малко от 1 на 100, но повече от 1 на 1 000	Редки: по-малко от 1 на 1 000, повече от 1 на 10 000
Много редки: по-малко от 1 на 10 000 включително и изолирани случаи	

4.1. Нежелани лекарствени реакции

Кожа:

Нечести: копривна треска (уртикария) с мехури

Стомашно-чревен тракт:

Лекарственият продукт съдържа лактоза, поради което при чувствителни към нея пациентки, макар и рядко, е възможна появата на гастроинтестинални нарушения или на лаксативен ефект.

4.2. Ако забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ФЕМИКУР Н КАПСУЛИ

Лекарството да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Продуктът да не се използва след датата на изтичане срока на годност, посочена върху опаковката!

Условия за съхранение

Няма специални указания за съхранение.

Дата на последно одобрение на листовката
{мм /гггг} януари 2008

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Предупреждение за диабетици:

1 твърда капсула съответства на 0,007 хлебни единици (BU)

6.1. Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба

Schaper & Brümmer GmbH & Co.KG,
Bahnhofstraße 35, D-38259 Salzgitter,
Telefon +49 (0) 53 41 3 07-0, Fax +49 (0) 53 41 3 07-1 24
Info@schaper-bruemmer.de
<http://www.schaper-bruemmer.de>

