

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

**НУРОФЕН ФЕМИНА ФОРТЕ 512 mg обвити таблетки**  
**Ибупрофен натрий**  
**NUROFEN FEMINA FORTE 512 mg coated tablets**  
**Ibuprofen sodium**

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.

Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 10 дни.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

### Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Нурофен Фемина Форте и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да използвате Нурофен Фемина Форте
3. Как да използвате Нурофен Фемина Форте
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Нурофен Фемина Форте
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА	
Листовка Приложение 2	
Към Рег. №	20100648
Разрешение №	/
Одобрение №	СА-30258, 02-07-2013

### 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НУРОФЕН ФЕМИНА ФОРТЕ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Нурофен Фемина Форте съдържа ибупрофен натрий, който принадлежи към групата на нестероидните противовъзпалителни лекарствени продукти (НСПВС).

НСПВС облекчават симптомите като променят телесния отговор на болката, отока и повишената температура. Също така този продукт съдържа такава форма на ибупрофен, която лесно се разгражда в тялото. Това прави по-лесно абсорбирането му в кръвообръщението, така че бързо да достигне до първоизточника на болката.

Нурофен Форте x2 се прилагат за ефикасно облекчаване на:

- главоболие, болки в кръста, менструални болки, зъбобол, невралгия и мигрена
- мускулни болки, ревматични болки и болки при лек артрит
- симптомите при грип и простудни заболявания, повишена температура (треска)

### 2. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕМЕ НУРОФЕН ФЕМИНА ФОРТЕ

#### НЕ ПРИЕМАЙТЕ НУРОФЕН ФЕМИНА ФОРТЕ ако:

- ако сте алергични (свърхчувствителни) към ибупрофен, ацетилсалицилова киселина или към някоя от останалите съставки на Нурофен Фемина Форте
- получавате влошаване на астма, алергични обриви или сърбежи, алергична хрема, когато взимате ибупрофен, ацетилсалицилова киселина или подобни на тях лекарствени продукти
- имате тежко чернодробно, бъбречно или сърдечно заболяване
- имате язва на стомаха, перфорация или кръвоизлив



- сте в последния триместър на бременността
- вашата възраст е под 12 години

**Обърнете специално внимание при употребата на Нурофен Фемина Форте ако:**

- имате високо кръвно налягане
- имате астма или сте получавали астматични пристъпи
- имате бъбречни, сърдечни, стомашно-чревни или чернодробни проблеми
- имате системен лупус еритематозус – заболяване, което повлиява имунната ви система; причинява ставни болки, кожни изменения и проблеми на други части на тялото

**Предупреждения:**

Лекарства като Нурофен Фемина Форте могат да бъдат свързани с леко увеличен риск от сърдечен инцидент („миокарден инфаркт“) или инсулт. Всеки риск е по-вероятен при високи дози и при продължително лечение. Не превишавайте препоръчаните дози и продължителността на лечението 10 дни.

Ако имате проблеми със сърцето, прекаран инсулт или мислите, че за Вас може да има риск от появата им (например ако имате високо кръвно налягане, диабет, повишени стойности на холестерол или сте пушач) трябва да обсъдите лечението с Вашия лекар или фармацевт.

**Прием и употреба на други лекарства**

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

- редовно приемате други лекарствени продукти, особено ако това са:
  - други облекчаващи болката лекарствени продукти, съдържащи ацетилсалицилова киселина, ибупрофен или други от групата на нестероидните противовъзпалителни лекарствени продукти
  - лекарствени продукти за високо кръвно налягане, включително и диуретици
  - лекарствени продукти за разреждане на кръвта (антикоагуланти)
  - ниски дози ацетилсалицилова киселина (75 mg веднъж дневно)
  - кортикостероиди
  - метотрексат (противораково лекарство)
  - литий (лекарство срещу депресия)
  - зидовудин (лекарство за вирусни инфекции)

**Бременност и кърмене**

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употреба на което и да е лекарство.

Има данни за единични случаи при употреба на нестероидни противовъзпалителни лекарствени продукти, прилагани продължително и при по-високи дози, които могат да повлияят временно и обратимо възможността за забременяване.

**Важна информация относно някои съставки на Нурофен Фемина Форте**

- трябва да ограничавате прима на сол с вашата диета

**3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ НУРОФЕН ФЕМИНА ФОРТЕ**

Винаги приемайте Нурофен Фемина Форте точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

За възрастни и деца над 12 години:



Първоначално се приемат 1-2 таблетки с вода, след това ако е необходимо се вземат 1 или 2 таблетки на всеки 4 часа, Времето между два приема трябва да бъде най-малко 4 часа. Не приемайте повече от 6 таблетки за 24 часа.  
Не е подходящ за деца под 12 години.

Ако симптомите продължат или се влошат или се появят нови симптоми, консултирайте се с лекар или фармацевт. Не трябва да приемате това лекарство повече от 10 дни освен ако не е предписано така от лекар.

**Ако сте приели повече от необходимата доза НУРОФЕН ФЕМИНА ФОРТЕ**  
Ако сгрешите и приемете повече таблетки от посочената доза, незабавно се свържете с лекар.

#### 4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства Нурофен Фемина Форте може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нурофен Фемина Форте има добра поносимост и се приема много добре от повечето хора. В отделни случаи могат да се появят следните нежелани лекарствени реакции: стомашни смущения, болка, гадене, стомашна язва, оцветени в черно изпражнения, необяснимо свиркащо или затруднено дишане, бъбречни или чернодробни проблеми, главоболие, замайване и смущения в слуха, много рядко кожни обриви, сърбежи, лющене на кожата, склонност към лесно получаване на синини, отоци на лицето, повишена температура или треска, болки в гърлото или язви по устата.

Лекарства като Нурофен Фемина Форте могат да бъдат свързани с леко повишен риск от сърдечен инцидент („миокарден инфаркт“) или инсулт.

Ако се появят някои от тези странични реакции или други необичайни симптоми, спрете да взимате лекарствения продукт и незабавно се консултирайте с лекар.  
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

#### 5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ НУРОФЕН ФЕМИНА ФОРТЕ

Не се изискват специални условия на съхранение Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Нурофен Фемина Форте след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.  
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

#### 6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Нурофен Фемина Форте

- Активното вещество е: ибупрофен 400 mg (като натриев дихидрат)

- Другите съставки са: кроскармелоза натрий (E468), ксилитол (E967), микрокристална целулоза (E460), магнезиев стеарат (E572), силициев диоксид, колоиден E551i, кармелоза натрий (E466), талк (E553v), арабска гума, изсутена чрез разпрашаване (E414), захар, титанов диоксид (E171), макрогол 6000, червено мастило Опакод S-1-15094.





**Как изглежда Нурофен Фемина Форте и какво съдържа опаковката**  
Опаковка Нурофен Фемина Форте съдържа 12 или 24 обвити таблетки в картонена кутия.  
Не всички опаковки ще се продават на пазара.

**Притежател на разрешението за употреба:**  
**Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.**  
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH  
Великобритания

**Производител:**  
**Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.**  
Nottingham Site, Thane Road, Nottingham, NG90 2DB  
Великобритания

Дата на последно преразглеждане на листовката: март, 2013

