

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Флебодия 600 mg филмирани таблетки
диосмин
Flebodia 600 mg film-coated tablets
diosmin

Листовка - Приложение 2

Към РУ №: П - 6727, 22. 01. 2010

Одобрено: N=10/21.12.09

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Флебодия и за какво се използва
2. Преди да приемете Флебодия
3. Как да приемате Флебодия
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Флебодия
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФЛЕБОДИЯ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Името на Вашето лекарство е Флебодия.

Флебодия повишава тонуса на мускулите на стените на вените (венотоник) и защитава малките кръвоносни съдове - капилярите, като увеличава устойчивостта им на вредни влияния (вазопротектор).

Флебодия трябва да се използва само при възрастни.

- при проблеми в кръвообращението (тежест в краката, болка, отпуснатост на кожата при залежаване),
- за лечение на признаците на обострени хемороиди,
- за лечение на капилярна чупливост.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ ФЛЕБОДИЯ

Не приемайте Флебодия

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество или към някоя от останалите съставки съставки на Флебодия (описани в точка 6 Какво съдържа Флебодия),



Ако смятате, че някои от тези условия се отнасят за Вас, или имате някакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди лечението с Флебодия.

Обърнете специално внимание при употребата на Флебодия

- Ако проблемите и чупливостта на кръвоносните съдове не намалее до 15 дни, обърнете се към Вашия лекар за съвет дали да продължите лечението.
- Ако оплакванията от хемороидите не намалее няколко дни, след приема на Флебодия, обърнете се към Вашия лекар за съвет.
- Флебодия има максимален ефект, когато си установите здравословни навици. Избягвайте излагането на слънце, топлината, продължителното стоене прав, намалете наднорменото тегло. Ходенето пеша и носенето на специални чорапи подобрява кръвообращението,
- Прилагането на този лекарствен продукт не отменя специфичното лечение на някой анални заболявания

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност и кърмене

Употребата на Флебодия по време на бременност може да става само с предписание от лекар.

При кърмене употребата на Флебодия не се препоръчва.

Винаги се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да приемате което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Няма описано влияние на този лекарствен продукт върху способността за шофирането или работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Флебодия

Наличието на кохинил червено и пропилен гликол може да причини алергични реакции или дразнене по кожата.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ФЛЕБОДИЯ

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Приемайте Флебодия перорално (през устата), с чаша вода.

Ако лекарят не е назначил друго, се препоръчва:

При венозна недостатъчност: 1 таблетка дневно половин час преди сутрешното хранене,

При хемороиди: 2 до 3 таблетки дневно по време на хранене.



Ако сте пропуснали да приемете Флебодия

- Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Флебодия може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Възможни са леки храносмилателни проблеми, които рядко налагат спиране на лечението.

Поради наличието на кохинил червено има риск от алергични реакции.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ФЛЕБОДИЯ

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Флебодия след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява при температура под 25°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Флебодия

- Активното вещество е: диосмин.

Всяка филмирана таблетка съдържа 600 mg диосмин.

Другите съставки са: стеаринова киселина микронизирана, талк, плоиоксил 8 стеарат, силициев диоксид колоиден безводен, хипромелоза, микрокристална целулоза, пропилен гликол, титанов диоксид, кохинил червено (E 124), черен железен оксид, червен железен оксид, карнаубски восък, пчелен восък бял, шеллак.

Как изглежда Флебодия и какво съдържа опаковката

Флебодия се предлага под формата на филмирани таблетки в PVC/ алуминиев блистер по 15 таблетки. Блистерите са поставени в картонена кутия по 1 или 2 блистера, т.е. по 15 или 30 филмирани таблетки.



Притежател на разрешението за употреба
LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL
22 Avenue Aristide Briand
94110 ARCUEIL - Франция

Производител
INNOTHERA CHOUZY – Rue Rene Chantereau – L'Isle Vert
– 41150 Chouzy – sur – Cisse - Франция

Представителството за България
1113 София, ж.к. "Изток", ул. "Д-р Любен Русев", № 22,
ет.1, ап. 3
тел.: 02/ 87 00 462,
e-mail: innotech_bulgaria@cablebg.net

Дата на последно одобрение на листовката

