

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

СИНЕКОД 0.15% Сироп
Бутамиратов цитрат

SINECOD 0.15% Syrup
Butamirate citrate

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	26020384
Разрешение №	18686 / 09.07.2012
Собствен №	/

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както ви е казал вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.
- Ако сле 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява **СИНЕКОД 0.15% Сироп** и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате **СИНЕКОД 0.15% Сироп**
3. Как да използвате **СИНЕКОД 0.15% Сироп**
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате **СИНЕКОД 0.15% Сироп**
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява **СИНЕКОД 0.15% Сироп** и за какво се използва

СИНЕКОД 0.15% Сироп съдържа активното вещество бутамиратов цитрат, което принадлежи към групата лекарствени средства за потискане на кашлицата.

СИНЕКОД 0.15% Сироп се използва за симптоматично лечение на кашлица от различен произход.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате **СИНЕКОД 0.15% Сироп**

Не използвайте **СИНЕКОД 0.15% Сироп**

- Ако сте алергични към активното вещество бутамиратов цитрат или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).



Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с вашия лекар или фармацевт преди да използвате **СИНЕКОД 0.15% Сироп**. Консултирайте се с вашия лекар или фармацевт, ако кашлицата продължава повече от 7 дни.

Други лекарства и СИНЕКОД 0.15% Сироп

Избягвайте едновременната употреба на **СИНЕКОД 0.15% Сироп** с други противокашлични средства, защото това може да доведе до задържане на секрет в дробовете ви.

Информирайте вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства, включително лекарства или хранителни добавки, отпуснати без рецепта.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите не използвайте **СИНЕКОД 0.15% Сироп**, освен ако не ви е препоръчано от вашия лекар.

Шофиране и работа с машини

В редки случаи, **СИНЕКОД 0.15% Сироп** може да намали бдителността при някои хора, в сравнение с нормалното състояние. Ако това се прояви при вас, трябва да сте предпазливи в използването на това лекарство при шофиране или работа с машини. Вашето дете трябва да избягва карането на велосипед или скутер в уличното движение, когато използва **СИНЕКОД 0.15% Сироп**.

СИНЕКОД 0.15% Сироп съдържа:

Сорбитол (Е 420): ако вашият лекар ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, обърнете се към него преди да използвате **СИНЕКОД 0.15% Сироп**.

Етанол: **СИНЕКОД 0.15% Сироп** съдържа малки количества етанол (алкохол), по-малко от 100 mg в една доза.

3. Как да използвате СИНЕКОД 0.15% Сироп

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в листовката или както ви е казал вашия лекар или фармацевт.

Не използвайте **СИНЕКОД 0.15% Сироп** повече от 7 дни (една седмица) без да се посъветвате с вашия лекар.

Деца от 3 години до 6 години – 5 ml (1 чаена лъжичка) 3 пъти дневно;

Деца от 6 години до 12 години- 10 ml (2 чаени лъжички) 3 пъти дневно;

Юноши над 12 години: 15 ml (1 супена лъжица) 3 пъти дневно;

Възрастни – 15 ml (1 супена лъжица) 4 пъти дневно.

Измивайте и подсушавайте мерителната чашка след всяка употреба от вас или други хора.



Ако сте използвали повече от необходимата доза СИНЕКОД 0.15% Сироп

Ако сте използвали повече от необходимата доза **СИНЕКОД 0.15% Сироп**, консултирайте се веднага с вашия лекар.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства **СИНЕКОД 0.15% Сироп** може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Следните нежелани реакции могат да се появят в редки случаи (могат да засегнат между 1 и 10 на всеки 10000 човека) - сънливост, кожни обриви, гадене и диария. Тези нежелани реакции трябва да изчезнат след намаляване на дозата или спиране на лечението.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

5. Как да съхранявате СИНЕКОД 0.15% Сироп

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте **СИНЕКОД 0.15% Сироп** след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Съхранявайте в оригиналната опаковка.

Никога не връщайте останалият в мерителната чашка лекарствен продукт обратно във флакона.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа СИНЕКОД 0.15% Сироп

Активното вещество е бутамиратов цитрат.

Другите съставки (помощни вещества) са: разтвор на сорбитол 70 % w/w, глицерол, захарин натрий, бензоена киселина, ванилин, натриев хидроксид 30 % w/w, етанол 96 % v/v, пречистена вода.

Как изглежда и какво съдържа опаковката

СИНЕКОД се предлага под формата на перорални капки, разтвор, сироп и таблетки с удължено освобождаване..

СИНЕКОД 0.15% Сироп е бистър, безцветен, с аромат на ванилия, сладък и леко горчив сироп. Разпространява се в флакон от тъмно стъкло, снабден с капачка, ограничаваша отварянето от деца. Опаковка: 200 ml.



Притежател на разрешението за употреба и производител

Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstrasse 40, 81379 München, Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Салвис Фарма ООД,
София 1528, ул. Димитър Пешев 5,
тел.: +359 882532901

Дата на последно преразглеждане на листовката

