

Листовка: Информация за потребителя

Zeel T, tablets
Зил Т, таблетки

Хомеопатичен лекарствен продукт

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Зил Т и за какво се използва
2. Преди да приемете Зил Т
3. Как да приемете Зил Т
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Зил Т
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Зил Т и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт.

Използва се при артроза /особено гонартроза/, полиартроза, спондилартроза, хumerоскаларен периартрит.

2. Преди да приемете Зил Т

- Не приемайте Зил Т ако имате свръхчувствителност към отровен бръшлян, арника и/или някоя от основните или помощни съставки на продукта. Да се използва след консултация с лекар при настоящи или минали чернодробни заболявания и/или при едновременното приемане с хепатотоксични вещества.
- Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Ако имате непоносимост към някои захари се консултирайте с лекар преди приемането на този лекарствен продукт
- Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия
- Употреба на Зил Т с храни и напитки – няма несъвместимости.
- Бременност и кърмене – посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Тъй като продукта съдържа Sanguinaria, да не се използва по време на бременност и кърмене.
- Шофиране и работа с машини – Зил Т не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

3. Как да приемете Зил Т

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обикновено 3-5 пъти по 1 таблетка дневно. Таблетките не се гълтат, а се държат в устата до разтварянето им.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА	
Листовка - Приложение 2	
Към Reg. № 26777/02	
Разрешение № II-16552, 26.01.2012	
Одобрение № /	



Погълдането на таблетката не води до никакви вредни последствия както при деца, така и при възрастни!

- Употреба при деца - При деца до 3 год. възраст – по $\frac{1}{2}$ таблетка до 3 пъти дневно. От 3 до 6 год. възраст – по 1 таблетка до 3 пъти дневно. Над 6 год. възраст – дозата за възрастни.
- Ако сте приели повече от обичайната доза – Зил Т няма доза на предозиране
- Ако сте пропуснали да приемете Зил Т – Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.
- Ако сте спрели употребата на Зил Т – Ако имате никакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар

4. Възможни нежелани реакции

По време на лечението с продукти, съдържащи Sanguinaria, има съобщавани случаи на повишени нива на чернодробните функционални ензими (трансаминаза) и увеличение на серумния билирубин до лекарственно-индуцирана жълтеница (иктер; лекарствено обусловен токсичен хепатит), които се нормализират или понижават след прекратяване на приема на лекарството. В много редки случаи могат да се появят гастроентестинални усложнения или кожни реакции - до няколко дни след приема на лекарството. В единични случаи реакции на свръхчувствителност могат да се появят при пациенти с доказана свръхчувствителност към растения от сем. сложноцветни (Anacardiceae), т.е. арника

5. Как да съхранявате Зил Т

Без специални условия на съхранение.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !

Срок на годност – 5 години.

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Лекарствата трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация

- Какво съдържа Зил Т:

1 таблетка съдържа:

Активни вещества:

Cartilago suis	D4	0,3 mg
Funiculus umbilicalis suis	D4	0,3 mg
Embryo suis	D4	0,3 mg
Placenta suis	D4	0,3 mg
Rhus toxicodendron	D2	0,54 mg
Arnica montana	D1	0,6 mg
Solanum dulcamara	D2	0,15 mg
Symphytum	D8	0,15 mg
Sanguinaria canadensis	D3	0,45 mg
Sulfur	D6	0,54 mg



Nadidum	D6	0,03 mg
Coenzym A	D6	0,03 mg
Natrium diethyloxalaceticum	D6	0,03 mg
Acidum silicum	D6	3 mg
Acidum alpha-liponicum	D6	0,03 mg

Помощни вещества:

Магнезиев стеарат 1,5 mg

- Как изглежда и какво съдържа опаковката: Пластмасов контейнер, съдържащ 50 таблетки/ картонена кутия

- Притежател на разрешението за употреба и производител:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D-76532 Baden-Baden, Германия

- Дата на последно одобрение на листовката:

03.2011

