

Листовка: Информация за потребителя

Миртол 120 mg стомашно-устойчиви капсули, меки
Дестилат от смес от пречистени етерични масла от евкалипт, сладък портокал, мирта и лимон (66:32:1:1)

Myrtol® 120 mg gastro-resistant capsules, soft
Distillate of a mixture of rectified essential oils of eucalyptus, sweet orange, myrtle and lemon (66:32:1:1)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Миртол и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Миртол
3. Как да приемате Миртол
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Миртол
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Миртол и за какво се използва

Миртол е стомашно-устойчива мека капсула

Миртол се използва за симптоматично лечение на остри и хронични бронхити и синусити.

Миртол повлиява секрецията и кашлицата при заболявания на дихателните пътища, втечнява сгъстения секрет, засилва отделянето му, улеснява отхрачването и има противовъзпалителен ефект.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Миртол

Не приемайте Миртол

- ако имате възпалително заболяване на стомаха, червата или жлъчните пътища, или ако имате тежко чернодробно заболяване,

- ако сте алергични към активното вещество или някоя от останалите съставки на Миртол.

Не трябва да давате това лекарство на деца под 4-годишна възраст.

Предупреждения и предпазни мерки

Ако симптомите Ви продължат или се влошат или, ако получите задух или висока температура, ако започнете да изкашляте хрипки, които съдържат кръв или гной, трябва незабавно да се консултирате с лекар.

Ако страдате от бронхиална астма, магарешка кашлица или други респираторни заболявания, съпроводени от свръхчувствителност на дихателната система, трябва да приемате това лекарство, само след като сте говорили с Вашия лекар.

Други лекарства и Миртол

Няма известни взаимодействия с други лекарства.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Бременност, кърмене и фертилитет

Въпреки че липват съобщения за тератогенен ефект по време на бременност, особено през първото тримесечие, това лекарство може да се прилага само след консултация с лекар.

Поради липофилните свойства на това лекарство, преминаването в кърмата трябва да се счита за много вероятно.

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Това лекарство няма влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Миртол съдържа сорбитол. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете това лекарство.

3. Как да приемате Миртол

В случай, че не е предписано друго, се прилагат следните препоръки за дозиране:

Възрастни и деца над 10 години:

При остри случаи приемат по 2 капсули 4-5 пъти дневно; при хронични заболявания се приемат по 2 капсули 3 пъти дневно. Тази дозировка се препоръчва и за поддържаща терапия.

За да се улесни отхрачването сутрин, в случаи на хроничен бронхит, се приемат по 2 капсули Миртол допълнително вечер преди лягане.

Деца от 4 до 10 години приемат 1 капсула Миртол 4-5 пъти дневно при остри състояния и по 1 капсула Миртол 3 пъти дневно при хронични състояния. За по-добър сън последната доза може да се приема преди лягане.

Капсулите трябва да се приемат без да се дъвчат ½ час преди хранене с голямо количество хладка течност.

Продължителност на лечението

Продължителността на лечението с Миртол зависи от оплакванията. При хронични заболявания на дихателните пътища е възможна по-продължителна терапия.

За лечение на хронични заболявания, продължителността на терапията трябва да бъде обсъдена с лекуващия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Миртол

Ако сте приели по-голямо количество Миртол следните мерки трябва да бъдат предприети от Вашия лекар:

Течен парафин 3ml/kg тегло перорално, промивка на стомаха с 5 % разтвор на натриев бикарбонат, кислородна терапия.

Ако сте пропуснали да приемете Миртол

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Като всички лекарства, Миртол може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите реакции са изброени по-долу в низходящ ред според честотата на възникване:

В нечести случаи (могат да засегнат до 1 на 100 човека) могат да възникнат оплаквания в стомашно-чревната област (например стомашна болка/епигастрилен дискомфорт) и промяна на вкуса.

Рядко (могат да засегнат до 1 на 1 000 човека) могат да възникнат гадене, повръщане или диария и реакции на свръхчувствителност (като кожен обрив, сърбеж, оток на лицето, задух или нарушения на кръвообращението).

Много рядко (могат да засегнат до 1 на 10 000 човека) може да възникне раздвижване на камъни, съществуващи в бъбреците и жлъчката.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка

нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата:

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Миртол?

Да се съхранява под 25 °C!

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Срокът на годност на продукта е 3 години.

Да не се употребява след изтичане срока на годност, който е отбелязан на опаковката.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Миртол

Една стомашно-устойчива мека капсула съдържа:

- 120 mg дестилат от смес от пречистени етерични масла от евкалипт, сладък портокал, мирта и лимон
- Помощни вещества: Средно-верижни триглицериди; желатин; глицерол; сорбитол; хипромелоза ацетат сукцинат; триетил цитрат; натриев лаурилсулфат; талк; декстрин; амониев глициризат.

Как изглежда Миртол и какво съдържа опаковка

Една опаковка съдържа 20 стомашно-устойчиви меки капсули.

Една опаковка съдържа 50 стомашно-устойчиви меки капсули.

Една опаковка съдържа 100 стомашно-устойчиви меки капсули.

Притежател на разрешението за употреба и производител:

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG

Kieler Strasse 11

25551 Hohenlockstedt

Германия

Дата на последно преразглеждане на листовката

Март 2020