



Листовка: информация за потребителя

# НЕО-АНГИН® без захар

1,20 mg/0,60 mg/5,72 mg таблетки за смучене  
2,4 - дихлоробензил алкохол/амилметакрезол/левоментол

# neo-angin® sugar-free

1,20 mg /0,60 mg /5,72 mg lozenges  
2,4 - dichlorobenzyl alcohol/amylnmetacresol/levomenthol

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Винаги приемайте това лекарство, точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3-4 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

## Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Нео-ангин® без захар и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Нео-ангин® без захар
3. Как да приемате Нео-ангин® без захар
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Нео-ангин® без захар
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

## 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НЕО-АНГИН® БЕЗ ЗАХАР И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

За симптоматично лечение на леки инфекции в устната кухина, вкл. ларингити, фарингити, тонзилити, гингивити.

## 2. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ НЕО-АНГИН® БЕЗ ЗАХАР

### Не приемайте Нео-ангин® без захар

- Ако сте алергични (свръхчувствителни) към някое от активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- При деца под 6 годишна възраст

### Предупреждения и предпазни мерки

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него преди да вземете този продукт.

Нео-ангин® без захар не е подходящ за приложение при деца под



6 годишна възраст. Прилагането на лекарствения продукт при малки деца може да доведе до бронхоспазъм и гърчове.

### Други лекарства и Нео-ангин® без захар

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Не са известни взаимодействия с други лекарства при перорален прием.

### Нео-ангин® без захар с храни и напитки

Нео-ангин® без захар може да се приема независимо от храненията.

### Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Няма клинични данни за влиянието на Нео-ангин® без захар по време на бременност и кърмене и затова този продукт трябва да се приема внимателно от бременни и кърмещи жени. Поради недостатъчна информация, не е възможно напълно да се изключи рискът за плода. Ето защо, ако сте бременна, моля консултирайте се с Вашия лекар преди приемането на този лекарствен продукт.

### Шофиране и работа с машини

Нео-ангин® без захар не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

### Нео-ангин® без захар таблетки за смучене съдържат кохинил червено А (E124) и изомалт (E953)

Нео-ангин® без захар таблетки за смучене съдържат оцветителя кохинил червено А (E124), който може да предизвика алергични реакции.

Нео-ангин® без захар таблетки за смучене съдържат 2,58 g изомалт (E953), като заместител на захарта в една таблетка за смучене, което отговаря на 6 kcal (26 kJ).

Това трябва да се има предвид при болни със захарен диабет. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него преди да вземете този лекарствен продукт. Изомалт може да има слабо изразено слабително действие.

## 3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ НЕО-АНГИН® БЕЗ ЗАХАР

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако не Ви е предписано друго от Вашия лекар, спазвайте следните указания:

Възрастни и деца над 6 годишна възраст трябва да приемат по 1 таблетка за смучене на всеки 2-3 часа. Таблетката трябва да се остави да се разтвори бавно в устата. Максималната дневна доза е 6 таблетки за смучене.



<b>Bezeichnung:</b> PB neo-angin zuckerfrei <b>Inhalt:</b> - <b>Artikel-Nr.:</b> 149491 <b>Material-Nr.:</b> 32 013 038 <b>Druck-Kennz.:</b> 09P0120 <b>Laetus-Code:</b> 67 <b>AG-Nr.:</b> - <b>EAN-Code:</b> - <b>PZN-Code:</b> - <b>Land:</b> BG <b>Zeichn.-Nr.:</b> -	<b>Format:</b> 190 x 210 mm <b>Druckfarben:</b> <b>1) ■ Black</b> <b>2)</b> <b>3)</b> <b>4)</b> <b>5)</b> <b>6)</b> <b>7)</b>	<b>Lackausparung:</b> <b>I) -</b> <b>II) -</b> <b>III) -</b> <b>IV) -</b> <b>V) -</b>  <b>Lack:</b> <input type="checkbox"/> <b>Lackfrei:</b> <input type="checkbox"/> <b>Effekt-Lack:</b> <input type="checkbox"/> <b>Prägung:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Verwendete Schriften:</b> <i>Myriad Pro</i>  <b>Mindestschriftgröße:</b> 9 pt <i>(1,5 mm x-Höhe)</i> <b>Mindestzeilenabst.:</b> 3,5 mm	<b>Datum:</b> 05.02.2020 <b>Version:</b> 02 <b>SB:</b> TKU <b>PR:</b> JTI <b>Seite:</b> 1 / 2 <b>EAN geprüft und lesbar:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <b>Freigabe:</b>
--	---	--	--	--



#### Продължителност на лечението

Трябва да се свържете с Вашия лекар, ако симптомите Ви се влошат или не се подобрят след 3-4 дни.

#### Ако сте приели повече от необходимата доза Нео-ангин® без захар

Няма съобщения за случаи на предозирание.

#### Ако сте пропуснали да приемете Нео-ангин® без захар

Ако сте пропуснали да приемете или сте приели по-малка от необходимата доза Нео-ангин® без захар, продължете да вземате лекарството според указанията. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

#### Ако сте спрели употребата на Нео-ангин® без захар

Няма опасност от възникване на някакви проблеми при спиране на употребата на Нео-ангин® без захар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### 4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Много редки (може да засегнат до 1 на 10 000 човека): възпаление на лигавицата на устата и стомаха

Оцветителят кохинил червено А (Е 124) може да причини алергични реакции.

#### Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата:

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

#### 5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ НЕО-АНГИН® БЕЗ ЗАХАР

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.



Да се съхранява при температура под 30° С.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт, как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

#### 6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

##### Какво съдържа Нео-ангин® без захар

Активните вещества са: 2,4-дихлоробензилов алкохол, амилметакрезол, левоментол

Една таблетка за смучене съдържа: 2,4-дихлоробензил алкохол 1,20 mg, амилметакрезол 0,60 mg, левоментол 5,72 mg

Другите съставки са: Масло от звездовиден анасон, масло от лютив мента, изомалт, винена киселина, кохинил червено А (Е124).

##### Как изглежда Нео-ангин® без захар и какво съдържа опаковката

Червени, кръгли полупрозрачни таблетки за смучене.

Оригинална опаковка – картонена кутия с 16 и 24 таблетки за смучене в блистери от PVC/PVdC и алуминиево фолио.

##### Притежател на разрешението за употреба и производител:

Divapharma GmbH

12274 Berlin

Германия

##### Дата на последно преразглеждане на листовката

Юли 2019



<b>Bezeichnung:</b> PB neo-angin zuckerfrei	<b>Format:</b> 190 x 210 mm	<b>Lackausparung:</b>	<b>Verwendete Schriften:</b>	<b>Datum:</b> 05.02.2020	<b>Version:</b> 02
<b>Inhalt:</b> -	<b>Druckfarben:</b>	I) -	Myriad Pro	<b>SB:</b> TKU	<b>Seite:</b> 2 / 2
<b>Artikel-Nr.:</b> 149491	1) ■ Black	II) -		<b>PR:</b> JTI	
<b>Material-Nr.:</b> 32 013 038	2)	III) -		<b>EAN geprüft und lesbar:</b>	
<b>Druck-Kennz.:</b> 09P0120	3)	IV) -		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
<b>Laetus-Code:</b> 67	4)	V) -		<b>Freigabe:</b>	
<b>AG-Nr.:</b> -	5)	<b>Lack:</b> <input type="checkbox"/>			
<b>EAN-Code:</b> -	6)	<b>Lackfrei:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Mindestschriftgröße:</b> 9 pt		
<b>PZN-Code:</b> -	7)	<b>Effekt-Lack:</b> <input type="checkbox"/>	(1,5 mm x-Höhe)		
<b>Land:</b> BG		<b>Prägung:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Mindestzeilenabst.:</b> 3,5 mm		
<b>Zeichn.-Nr.:</b> -					