

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ТРОКСЕРУТИН ДС
2 % гел

TROXERUTIN DS
2 % gel
Троксерутин (*Troxerutin*)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Листовка - Приложение 2

Към Рег. № 20040044

Разрешение № ВГ/М/Мб-5474-5

Обсрание № 01-02-2019

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

В тази листовка:

1. Какво представлява ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да използвате ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел
3. Как да използвате ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел и за какво се използва

Как действа ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел?

ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел притежава венотонично, капиряротонично, обезболяващо и противовъзпалително действие. Намалва повишената пропускливост на капилярите. Антагонизира венодилатативния ефект на хистамина, брадикинина и други медиатори на възпалението. Действа противовъзпалително върху перивенозната тъкан. Намалва отока, отстранява болката, подобрява трофиката и патологичните промени, свързани с венозната недостатъчност.

За какво се използва ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел?

ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел се използва при болка и оток следствие на хронична венозна недостатъчност, отекли и тежки крака, оток следствие на травма, мускулни травми, навяхване и изкълчване, болка след вено-склерозираща терапия.

2. Какво трябва да знаете преди да използвате ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел

Не използвайте ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел

- ако сте алергични към троксерутин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Не трябва да се нанася върху лигавици, открити рани и екземи.

Други лекарства и ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел



Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

При външно приложение на троксерутин няма данни за лекарствени взаимодействия.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди използването на това лекарство.

Няма данни за нежелани ефекти върху плода и новороденото. Лекарственият продукт може да се прилага през втория и третия триместър на бременността, както и по време на кърмене.

Шофиране и работа с машини

Употребата на продукта не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел съдържа бензалкониев хлорид разтвор, който е дразнещо вещество и може да причини кожни реакции.

3. Как да използвате ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел

Винаги използвайте ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел точно, както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Начин на приложение: Прилага се върху кожата.

Поразеният участък от кожата се намазва сутрин и вечер с малко количество гел. Нанася се и се втрива с леко масажирание отдолу нагоре до окончателното проникване на продукта.

Ако сте използвали повече от необходимата доза ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел

Няма опасност от предозиране поради начина на употреба. При случайно поглъщане на големи количества е необходимо промиване на устната кухина и стомаха, при нужда симптоматично лечение.

Ако сте пропуснали да използвате ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел

Ако по някаква причина е пропуснато използването на продукта, пациентът може по всяко време да извърши манипулацията, като съблюдава интервала между две нанасяния да е не по-малко от 10-12 часа.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Не са установени нежелани лекарствени реакции, освен в редки случаи е възможна появата на зачервяване, сърбеж, кожни обриви. Те преминават бързо след прекъсване на лечението.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. "Дамян Груев" № 8; 1303 София; тел.: +359 2 8903417; уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.



5. Как да съхранявате ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел

При температура под 25°C, на сухо и защитено от светлина място.

Да не се замразява!

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Срок на годност:

5 години.

Срок на годност след отваряне на първична опаковка: 1 месец.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел

- Активното вещество е: троксерутин. 1 g гел съдържа 20 mg троксерутин.
- Другите съставки са: карбомер, троламин, динатриев едетат, бензалкониев хлорид разтвор, пречистена вода.

Как изглежда ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел и какво съдържа опаковката

ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел е с жълт до бледо кафяв цвят, хомогенен, прозрачен гел, 2 % за външно приложение в алуминиева туба по 40 g, поставена в индивидуална картонена кутия.

Производител

ВЕТПРОМ АД, 2400 гр. Радомир, България, ул. "Отец Паисий" № 26

тел.: 02 451 93 00

e-mail: office@vpharma.bg

Притежател на разрешението за употреба

ДАНСОН-БГ ООД, 2400 гр. Радомир, България, ул. "Отец Паисий" №26,

тел.: 02 451 93 00,

e-mail: office@danhson.bg

Дата на последна редакция на листовката: 11/2018 г.